


<b>PRODUCTO</b>	<b>CYSTUROL 40comp.</b>	
<b>COMPOSICIÓN</b>	<b>Ingredientes:</b> 108-120 mg de extracto seco de <b>hoja de gayuba</b> ( <i>Arctostaphylos uva-ursi L. Spreng</i> ), equivalente a 432-600 mg de planta, que corresponde a 27 mg de derivados de hidroquinona calculados como arbutina anhidra. 46,25 mg de extracto seco de <b>hoja de abedul</b> ( <i>Betula pendula Roth y/o Betula pubescens Ehrh.</i> ), equivalente a 185-277,5 mg de planta. 40 mg de extracto seco de <b>parte aérea de vara de oro</b> ( <i>Solidago gigantea Ait.</i> ), equivalente a 160-240 mg planta.	
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<b>Mujeres adultas</b> Tome 2 comprimidos 2 o 3 veces al día. Los comprimidos deben tragarse enteros con un vaso de agua u otro líquido. El efecto de Cysturol se potencia bebiendo abundantemente. Beba abundante líquido (un mínimo de 1-2 litros al día) para conseguir un lavado suficiente de las vías urinarias. Este medicamento contiene arbutina y no se debe tomar durante más de 5 días consecutivos, salvo por recomendación médica. Los medicamentos que contienen extracto de hoja de gayuba no deben tomarse para más de cinco episodios de 5 días consecutivos al año. El uso continuo de Cysturol no debe superar los 14 días. <b>Uso en niños y adolescentes</b> Dado que no se dispone de datos suficientes, no se recomienda el uso de Cysturol en niños y adolescentes menores de 18 años	
<b>PRECAUCIONES</b>	Consulte a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar Cysturol. Debe consultar a un médico si empeora o si no mejora después de 4 días. Cysturol está indicado en mujeres adultas (a partir de 18 años). No se recomienda el uso del medicamento en hombres sin que se haya valorado la situación clínica y le sea recomendado por el médico. Las infecciones de las vías urinarias pueden tener graves consecuencias. Si padece una infección crónica de las vías urinarias o tiene las piernas hinchadas (edema), solamente deberá tomar Cysturol con consentimiento expreso de su médico. Consulte a su médico si experimenta la aparición de fiebre, dificultades para orinar, retortijones o sangre en la orina, dolor costal, lumbar o de estómago durante el uso del medicamento. Puede provocar una coloración marrón verdosa inofensiva de la orina.	
<b>CLASE DE PRODUCTO</b>	Medicamento tradicional a base de plantas	
<b>CÓDIGO NACIONAL</b>	716785.3	
<b>OTRAS INFORMACIONES</b>	No utilizar en caso de embarazo o lactancia ni en niños menores de 18 años.	